

Hinweise zur Sortenwahl 2022

Knautgras



SACHSEN-ANHALT

Landesanstalt für
Landwirtschaft und
Gartenbau



Herausgeber

Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Strenzfelder Allee 22
06406 Bernburg
Telefon: 03471 334 0
e-mail: Poststelle@llg.mule.sachsen-anhalt.de
web-Seite: <http://www.llg.sachsen-anhalt.de>

Bearbeiter

Dezernat 21 Pflanzenbau, ökologischer Landbau
AG Standortgerechte Grünlandbewirtschaftung
Lindenstraße 18
39606 Iden
Dr. Bärbel Greiner
Telefon: 039390 6246
e-mail: baerbel.greiner@llg.mule.sachsen-anhalt.de

Versuchsdurchführung Iden
Dezernat 21 Pflanzenbau, ökologischer Landbau
AG Standortgerechte Grünlandbewirtschaftung

Petra Veh

Henning Woche

Versuchsdurchführung Hayn
Dezernat 22 Regionale Feldversuche, Sortenprüfung

Lisa Blödner

Veröffentlichung und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers!

Stand: 24.10.2022



Abkürzungsverzeichnis:

AG	Anbaugebiet
Zul.jahr	Jahr der Sortenzulassung
BSA	Bundessortenamt
RG	Reifegruppe

Züchterverzeichnis:

Barenbrug	Barenbrug Holding B.V., Nijmegen Niederlande
DLF	DLF Trifolium A/S, Roskilde Dänemark
DSV	Deutsche Saatveredlung AG, Lippstadt
Freudenberger	Feldsaaten Freudenberger G.m.b.H. & Co. Kommanditgesellschaft, Krefeld
Rudloff	Rudloff Feldsaaten GmbH, Bad Schwartau
R2n S.A.S.	R2n S.A.S., Rodez Cedex, Frankreich
Steinach	Saatzucht Steinach GmbH & Co KG, Steinach

Knautgras ist ein massenwüchsiges, winterhartes und gegen Trockenheit unempfindliches Obergras. Auf zusagenden Standorten wirkt es bei hohen Anteilen in der Ansaatmischung stark verdrängend. Bei verspätetem Schnitt wird Knautgras schnell überständig. Es ist in Grünlandmischungen zur Schnitt- und Weidenutzung für zeitweilig trockene Standorte und in Ackerfuttermischungen für trockene und zeitweise trockene Standorte enthalten.

Grundlage für die Sortenempfehlungen sind Ergebnisse aus Landessortenversuchen, die länderübergreifend für die Hauptanbauregionen Niederungsgrünland und Sommertrockene Lagen in den Länderarbeitsgruppen Nordost und Mitte-Süd geplant, durchgeführt und ausgewertet werden. Die Anbauregion Niederungsgrünland incl. Moore und Auengrünland ist das Anbauggebiet 3. Es umfasst nahezu alle Grünlandflächen im Norden Sachsen-Anhalts, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern und einen Teil der Grünlandflächen im Nordosten Niedersachsens. Das Anbauggebiet 6, sommertrockene Lagen, erstreckt sich über die Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg.

Hinweise zu den Ansaatmischungen auf dem Grünland und im mehrjährigen Ackerfutterbau sowie zur Durchführung von Nachsaaten und Neuansaaten sind den Faltblättern „Mischungs- und Sortenempfehlungen Grünland“, „Nachsaat und Neuansaat auf Grünland“ sowie „Ansaatempfehlungen für den Ackerfutterbau“ und „Sortenempfehlungen für den Ackerfutterbau“ zu entnehmen.

Sortenempfehlungen Knaulgras Reifegruppe früh bis mittel

Sorte	RG	Züchter	Zul.- jahr	Sorteneigenschaften			Sortenempfehlungen für			
				Ertrag	Bonit- turen	Rost ¹⁾	Grünland- mischungen		Ackerfutter- mischungen	
							AG 3	AG 6	AG 3	AG 6
Baromat	5	Barenbrug	2020	0	+		X	X	X	X
Caius	4	R2n S.A.S.	2020	0	0		X	X	X	X
Donata	5	DLF	2001	0	+	+	X	X	X	X
Dragoner	4	Steinach	2010	0	0	+	X	X	X	X
Lidacta	4	DSV	1982	0	0	+	X	X	X	X
Lyra	5	Freudenberger	1997	0	0		X	X	X	X
Revolin	5	DSV	2010	0	+	+	X	X	X	X
Roprix	4	DSV	2020	+	0		X	X	X	X
Rosseur	5	DSV	2020	+	0		X	X	X	X
Treposno	4	Freudenberger	1997	+	+		X	X	X	X
Trerano	2	Freudenberger	1995	+	+		X	X		

¹⁾ nach Beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes 2020

Bonituren = Winterhärte, Narbendichte

- + = über dem Durchschnitt, weniger rostanfällig
- (+) = in einer Anbauregion über dem Durchschnitt
- 0 = Durchschnitt
- = unter Durchschnitt

Sortenempfehlungen Knaulgras Reifegruppe spät

Sorte	RG	Züchter	Zul.- jahr	Sorteneigenschaften			Sortenempfehlungen für			
				Ertrag	Bonituren	Rost ¹⁾	Grünlandmischungen		Ackerfuttermischungen	
							AG 3	AG 6	AG 3	AG 6
Aldebaran	6	DLF	2007	0	0	+	X	X	X	X
Barlegro	6	Barenbrug	2013	0	0		X	X	X	X
Diceros	7	Freudenberger	2010	+	-	+	X	X	X	X
Vostox	6	Freudenberger	2020	0	0		X	X	X	X

¹⁾ nach Beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes 2020

Bonituren = Winterhärte, Narbendichte

- + = über dem Durchschnitt, weniger rostanfällig
- (+) = in einer Anbauregion über dem Durchschnitt
- 0 = Durchschnitt
- = unter Durchschnitt