

# Hinweise zur Sortenwahl 2022

## Welsches Weidelgras



SACHSEN-ANHALT

Landesanstalt für  
Landwirtschaft und  
Gartenbau



## Herausgeber

Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

Strenzfelder Allee 22

06406 Bernburg

Telefon: 03471 334 0

e-mail: [Poststelle@llg.mule.sachsen-anhalt.de](mailto:Poststelle@llg.mule.sachsen-anhalt.de)

web-Seite: <http://www.llg.sachsen-anhalt.de>

## Bearbeiter

Dezernat 21 Pflanzenbau, ökologischer Landbau

AG Standortgerechte Grünlandbewirtschaftung

Lindenstraße 18

39606 Iden

Dr. Bärbel Greiner

Telefon: 039390 6246

e-mail: [baerbel.greiner@llg.mule.sachsen-anhalt.de](mailto:baerbel.greiner@llg.mule.sachsen-anhalt.de)

Veröffentlichung und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers!

Stand: 24.10.2022



## Abkürzungsverzeichnis:

AG	Anbaugebiet
Zul.jahr	Jahr der Sortenzulassung
BSA	Bundessortenamt
T	tetraploide Sorte

## Züchterverzeichnis:

Barenbrug	Barenbrug Holland B.V., Nijmegen, Niederlande
DLF	DLF Trifolium A/S, Roskilde Dänemark
DSV	Deutsche Saatveredlung AG, Lippstadt
ILVO	ILVO – Plant – Toegepaste Genetica en Veredeling, Melle Belgien
Freudenberger	Feldsaaten Freudenberger G.m.b.H. & Co. Kommanditgesellschaft, Krefeld
R2n S.A.S.	R2n S.A.S. (Societe RAGT 2N), Rodez Cedex, Frankreich
Semences	Semences de France Societe anonyme, Paris, Frankreich
Steinach	Saatzucht Steinach GmbH & Co KG, Steinach

Welsches Weidelgras gehört bei guter Wasser- und Nährstoffversorgung zu den leistungsstärksten Futtergräsern und ist in Ackergras- und Kleegrasmischungen für eine überjährige Nutzung enthalten. Kahlfröste und lang anhaltende Schneebedeckung können Auswinterungsschäden verursachen. Für die Sortenempfehlung wird neben dem Ertrag vorrangig die Neigung zur Auswinterung und die Rost- und Fusariumresistenz berücksichtigt. Für den einjährigen Ackerfutterbau sind auch ertragreiche Sorten geeignet, die eine geringere Winterhärte aufweisen, als die in der Tabelle aufgeführten Sorten.

Grundlage für die Sortenempfehlungen für Welsches Weidelgras in Sachsen-Anhalt sind Ergebnisse aus Landessortenversuchen in der Länderarbeitsgruppen Mitte-Süd und Daten der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes. In der Länderarbeitsgruppe Nordost wurden keine Landessortenversuche mit Welschem Weidelgras durchgeführt. Datengrundlage für die Sortenempfehlungen ist hier die Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes.

Die Anbauregion 3 umfasst Ackerfutterflächen im Norden Sachsen-Anhalts, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern und einen Teil der Ackerfutterflächen im Nordosten Niedersachsens. Das Anbauggebiet 6, sommertrockene Lagen, erstreckt sich über die Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg.

Weitere Hinweise sind den Faltblättern „Ansaatempfehlungen im Ackerfutterbau“ und „Sortenempfehlungen im Ackerfutterbau“ zu entnehmen.

## Sortenempfehlungen Welsches Weidelgras

			Sorteneigenschaften				Empfehlung Ackerfutter	
Sorte	Züchter	Zul.- jahr	Ertrag <sup>1)</sup>	Boni- turen <sup>1)</sup>	Rost- Resistenz <sup>1)</sup>	Fusarium- Resistenz <sup>1)</sup>	AG 3	AG 6
Barmultra II	T Barenbrug	2008	+	0		+	X	X
Bigdyl	R2n SAS	2018	0	+	+		X	X
Capelli	T Semences	2017	+	+	+		X	X
Carital	T Semences	2016	+	0			X	X
Daphnis	T Steinach	2016	+	+	+		X	X
Dolomit	T DSV	2009	+	0			X	X
Dolores	DSV	2018	+	0			X	X
Dorike	T DSV	2006	0	+	+		X	X
Goldoni	T DLF	2008	+	0		+	X	X
Hera	T Steinach	2013	+	0			X	X
Itaka	DLF	2008	0	0			X	X
Madlen	T Rudloff	2006	0	0			X	X
Melduo	Freudenberger	2017	0	+			X	X
Melina	Freudenberger	2017	0	+			X	X
Melquatro	T Freudenberger	2004	0	+			X	X
Melsprinter	T Freudenberger	2017	+	+			X	X
Mervana	T Freudenberger	2015	0	+	+		X	X
Messina	T ILVO	2016	+	+	+		X	X

Sorte	Züchter	Zul.- jahr	Sorteneigenschaften				Empfehlung Ackerfutter	
			Ertrag <sup>1)</sup>	Bonitu- turen <sup>1)</sup>	Rost- Resistenz <sup>1)</sup>	Fusarium- resistenz <sup>1)</sup>	AG 3	AG 6
Mustela	Steinach	2006	0	+			X	X
Oryttus	T Freudenberger	2019	+	+			X	X
Oryx	Freudenberger	2003	+	0			X	X
Rulicar	T R2n SAS	2019	+	+			X	X
Sendero	DSV	2019	+	0			X	X
Udine	T DLF	2011	+	+	+	+	X	X
Vizir	R2n SAS	2013	0	+			X	X
Zorro	T DLF	1996	0	+	+		X	X

<sup>1)</sup> nach Beschreibender Sortenliste Bundessortenamt 2020

Bonituren = Winterhärte, Narbendichte

+ = über dem Durchschnitt  
0 = Durchschnitt  
- = unter Durchschnitt